

Plantgoedmonitoring

Beoordeling plantgoed Narcis

Jaar:

Cultivar:

Partijnummer:

(bij samenvoegen partijen afzonderlijke % vermelden)

BKD nummer:

| Criteria | Waarde | Opmerkingen |
|---|--------|-------------|
| Maat bollen | | |
| Schuurbeoordeling bollen (% in monster) datum : | | |
| Ziekten | | |
| • % Bolrot in partij vóór uitzoeken | | |
| • % Bolrot | | |
| • % Huidziek | | |
| • % Penicillium | | |
| • % Bollen met narcisvlieg | | |
| Bolbeschadiging | | |
| • Mate van beschadiging door verwerken | | |
| • Als gevolg van breken | | |
| Overige opmerkingen (bijv andere gewassen) | | |
| • | | |
| • | | |
| Veldbeoordeling tijdens ziekzoeken (aanvangspercentage) | | |
| Virus | | |
| • % Zichtbaar virus | | |
| • % Ratelvirus | | |
| Aaltjes | | |
| • Soort aal/mate van aantasting | | |
| Partijzuiverheid | | |
| • % Dwalingen | | |
| Overige | | |
| • O.a. vuur, Stagonosporopsis | | |
| Veldkeuring BKD of eigen beoordeling (eindsituatie) | | |
| Klasse plantgoed | | |
| Virus | | |
| • % Ratelvirus | | |
| • % Overig virus | | |
| Partijzuiverheid | | |
| • % Dwalingen | | |
| Overige | | |
| • | | |
| Plantgoedbewaring: | | |
| Warmwaterbehandeling: datum, voorbehandeling, temperatuur en duur | | |
| Bolontsmetting (middelen en concentratie): | | |
| tijdens wwv (voorweken) | | |
| vlak voor planten | | |

Opmerkingen:

Plantgoedmonitoring

- Neem het plantgoedmonster vlak voor planten. Kies bij het bemonsteren een maat die jaarlijks voorkomt in verband met de vergelijking tussen de jaren.
- Beoordeel het monster in november na bewaring bij 20°C in verband met bolrot.
- Snij bij Fusarium gevoelige cultivars de bolbodem aan en let vooral op het gedeelte waar de spaan vast zit. Lichte infecties worden vaak pas zichtbaar na aansnijden.
- Een aantasting door krokusknolaaltjes (oa bij Tête-à-Tête) wordt pas na lang bewaren zichtbaar. Snij ook hiervoor de bolbodem aan.
- Eventuele (zware) kookschade wordt ook bij doorsnijden zichtbaar.
- Mechanische schade kan ook bij doorsnijden zichtbaar worden, bekend als stootblauw, dat enkele rokken diep kan gaan.
- Elke bol afzonderlijk beoordelen.
- Bij samenvoegen van meerdere herkomsten (tuinen/partijen) de oorspronkelijke percentages apart vermelden. Dit geldt voor virus maar ook voor % aantastingen en beschadigingen (meerdere kolommen maken).

Bepaal eerst de aantasting door ziekten en bepaal daarna aan de overige bollen de mate van bolschade. Deel de bollen in volgens de volgende verdeling. Noteer de percentages.

Indeling uitwendige bolschade:

1. gaaf: geen tot weinig direct zichtbare schade zichtbaar
2. matig: direct duidelijk zichtbare beschadigingen van de bolrok(ken)
3. zwaar: duidelijk diepe beschadigingen waarbij de beschadiging twee of meer rokken diep gaat; ook schade waarbij een stuk(je) van de rok(ken) ontbreekt
4. vestjesbollen met zichtbare bolschade



1. gave bollen



2. matig beschadigd



3. zwaar beschadigd



4. vestbollen